

cs

NÁVOD K POUŽITÍ
Medisorb R
MEMBRANE
Vstřebatelné krytl

POPIs

Medisorb R MEMBRANE je sterilní, vstřebatelný krytl ve formě poróvité membrány, které se používá ke krytl chronických, obtížné se hojících ran. Prostředek je navržen tak, aby vytvořil optimální prostředí pro regeneraci. Krytl se vstřebává pod vlivem enzymů přítomných v ráně. Produktami rozkladu obväzu sú látky prirodzene sa vyskytujú v ľudskom tele a ovplyvňujú regeneráciu tkaniva. Porézná štruktúra obväzu umožňuje odtok prebytočného exsudátu z prostredia rany a pôsobí resorpcií nie je potrebné obväz vymenovať, čím sa eliminuje sväčková bolesť a novovytvorené tkanivo je chránené pred poškodením. Produkt obsahuje látku živočíšneho pôvodu – kopolyester acetát-butylrú chitínu. Nebyť jstýný žiadne komplikácie ani nežiadúce účinky související s přímým působením krytl rany. Každou zraněnou nežádoucí příhodu související s prostředkem je nutné nahlásit výrobci a příslušnému orgánu země, ve které má užívatel nebo pacient místo bydliště.

ÚČEL A INDIKACE

Krytl je určen k léčbě mokvajících, chronických, obtížné se hojících, infikovaných nebo neinfikovaných ran různého původu, včetně žilních ran, diabetické nohy, otásků, postraumatických a chirurgických ran a popálenin. Prostředek je určen pro úpravě k léčbě mokvajících, chronických a obtížné se hojících ran.

KONTRAINDIKACE

Zdravotnický prostředek Medisorb R MEMBRANE nesmí být použit: • u osob s alergickou reakcí na chitin (získaný z křovců) a jeho deriváty.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nebyly zjištěny žádné komplikace ani nežádoucí účinky související s přímým působením krytl rany. Každou zraněnou nežádoucí příhodu související s prostředkem je nutné nahlásit výrobci a příslušnému orgánu země, ve které má užívatel nebo pacient místo bydliště.

UPUTÁNÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

- Prostředek na jedno použití. Opětovné přiložení krytl není možné z důvodu ztráty vlastností prostředku. Opětovné použití může vést k přenosu patogenů.
- Krytl Medisorb R MEMBRANE se prodává sterilní. Prostředek nelze opakovaně sterilizovat.
- Krytl nepoužívejte, pokud si nejste jisté sterility produktu.
- Nepoužívejte obväz, ak máte pochybnosti o jeho sterilitě.
- Nepoužívejte po datu expirace.
- Produkt obsahuje látku živočíšného původu – derivát chitínu. Vzhledem k přítomnosti látek živočíšného původu v krytl je nepřípustné u osob přecitlivělých na výrobky živočíšného původu.
- Krytl rany je určen pouze pro vnější použití.
- Na vnějším obalu (sáčku s krytl) je značka – po sterilizaci je červená.
- Postup je s lékařem: • před použitím u těhotných nebo kojících žen, • pokud se stav rany zhorší, • při absenci známek vstřebávání (více než jeden měsíc).
- Při přídě jakýchkoli pochybností ohledně použití prostředku.
- Nebyly zjištěny žádné reakce prostředku jako je jeho metabolických produktů s jinými prostředky, léčivými přípravky nebo jinými látkami.
- Nepoužíte si použití části krytl bezpečně zklidňuje v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

ZPŮSOB POUŽITÍ PROSTŘEDKU

- Prostředek je vhodné aplikovat ihned po otevření balení.
- Před aplikací krytl rany očištěte: • fyziologickým roztokem nebo jiným dezinfekčním/antibakteriálním přípravkem a poté osušte kůži suchým.
- chirurgicky při návštěvě odborného lékaře.
- Chcete-li obal otevřít, uchopte protilehlé okraje a zatahnete, dokud zcela neodkryjete krytl. Asepticky vyměňte krytl z obalu. Krytl vykazuje viskozitu 25% - 65%.
- Krytl krytl, aby pokryl celý povrch rany. U menších ran lze krytl ušitřnout na velikost, která umožňuje úplné zakrytí rany. V případě větších ran sa obväz může skrátit na velikost, která umožňuje úplné pokrytí rany. Při větších ranách možno aplikovat viac obväzov. Na vstřebatelný obväz sa odporúča dodatočne použiť absorpčný obväz a celé miesto zafixovať napríklad elastickým bandážovým seifkou.
- Ak dýje k resorpcii (narušení struktúry obväzu), je potrebné aplikovať ďalší obväz bez odstránenia predchádzajúceho. Postupujte podľa tohto postupu, kým sa rana nezahojí.

INFORMACE OHLEDNĚ STERILNÍ PROSTŘEDKU

Krytl Medisorb R MEMBRANE se prodává jako sterilní výrobek sterilizovaný zářením. Prostředek nelze opakovaně sterilizovat. Před použitím krytl rany po stanovenou dobu použitelnosti pouze v originálním obalu a při vhodných skladovacích podmínkách. Pokud je vnějším obal poškozen, je nutno se zdravotnickým prostředkem zacházet jako s nesterilním a nelze jej použít.

SKLADOVÁNÍ

- Krytl Medisorb R MEMBRANE musí skladovat: • na místě s omezeným přístupem slunečního světla a UV záření; • při teplotě v rozmezí 15°C až 35°C; • při vlhkosti 25% - 65%;
- v podmínkách, které jej chrání před navlhnutím a před mechanickým poškozením nebo chemickou kontaminací;
- v originálním jednotlivém obalu. Jakékoli mechanické poškození obalu může narušit sterilitu prostředku.

DALŠÍ INFORMACE

Študi bezpečnosti a klinické účinnosti prostředku je dostupné na stránkách tricomed.com

Krytl je dostupné také ve formě poróvité membrány s přísmaí mikroštruktúry (Medisorb R) a ve formě prášku (Medisorb R POWDER).

Vysvětlění symbolů uvedených na přední straně obalu je dostupné na stránkách tricomed.com

Datum vydání: 03.2024
Číslo vydání: REV. 2

sk

NÁVOD NA POUŽITIE
Medisorb R
MEMBRANE
Vstrebateľný obväz

CHARAKTERISTIKA

Medisorb R MEMBRANE je sterilný, vstrebateľný obväz vo forme poróviteho filmu na ošeterenie chronických, ťažko sa hojajúcich rán. Produkt je navrhnutý tak, aby vytváral optimálne regeneračné prostredie. Obväz sa vstrebáva vplyvom enzýmov prítomných v rane. Produktami rozkladu obväzu sú látky prirodzene sa vyskytujúce v ľudskom tele, ktoré ovplyvňujú regeneráciu tkaniva. Porézná štruktúra obväzu umožňuje odtok prebytočného exsudátu z prostredia rany a pôsobí ako resorpcia, nie je potrebné obväz vymenovať, čím sa eliminuje sväčková bolesť a novovytvorené tkanivo je chránené pred poškodením. Produkt obsahuje látku živočíšneho pôvodu – kopolyester acetát-butylrú chitínu. Nebyť jstýný žiadne komplikácie ani nežiadúce účinky související s přímým působením krytl rany. Každou zraněnou nežádoucí příhodu související s prostředkem je nutné nahlásit výrobci a příslušnému orgánu země, ve které má užívatel nebo pacient místo bydliště.

ÚČEL A INDIKACE

Obväz je určený na ošeterenie exsudatívnych ťažko sa hojajúcich chronických rán, infikovaných alebo neinfikovaných z rôznych príčin, ako sú napríklad rany žilového pôvodu, diabetická noha, preležaniny, traumatické rany, chirurgické rany a rany po popáleninách. Prostředek je určen pro úpravě k léčbě mokvajících, chronických a obtížné se hojících ran.

KONTRAINDIKACE

Zdravotnický prostředek Medisorb R MEMBRANE nesmí používat: • u lidí s alergiou na chitin (získaný z křovců) a na jeho deriváty.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nebyli zaznamenané žádné komplikácie ani nežiaduce účinky spojené s přímým působením obväzu. Každý závažný prípad týkajúci sa pomôcky sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu krajiny, v ktorej má používateľ alebo pacient bydlisko.

OPATRENIA PRI POUŽITÍ

- Produkt na jedno použitie. Opätovné použitie obväzu nie je možné z dôvodu straty sterility produktu. Pri opakovanom použití produktu môže dôjsť k prenosu patogénnych agensov.
- Obväz Medisorb R MEMBRANE sa ponúka na predaj v sterilnom stave. Výrobok sa nesmie opätovne sterilizovať.
- Nepoužívajte obväz, ak máte pochybnosti o jeho sterilitě.
- Nepoužívajte po dátume expirácie.
- Produkt obsahuje látku živočíšneho pôvodu – derivát chitínu. Vzhľadom k prítomnosti látok živočíšneho pôvodu v krytl je nepripustné u osob precitlivělých na výrobky živočíšného pôvodu.
- Krytl rany je určen pouze pro vnější použití.
- Na vnějším obale (sáčku s krytl) je značka – po sterilizaci je červená.
- Postup je s lékařem: • před použitím u těhotných nebo kojících žen, • pokud se stav rany zhorší, • při absenci známek vstřebávání (více než jeden měsíc).
- Při přídě jakýchkoli pochybností ohledně použití prostředku.
- Nebyly zjištěny žádné reakce prostředku jako je jeho metabolických produktů s jinými prostředky, léčivými přípravky nebo jinými látkami.
- Nepoužíte si použití části krytl bezpečně zklidňuje v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Obväz sa odporúča aplikovať ihneď po otvorení balenia.
- Pred aplikáci krytl rany očišťte: • fyziologickým roztokom alebo iným dezinfekčným/antibakteriálnym prípravkom a potom osušte pokožku suchým.
- chirurgicky pri návšteve odborného lekára.
- Chcete-li obal otevřít, uchopte protilehlé okraje a zatahnete, dokud zcela neodkryjete krytl. Asepticky vyměňte krytl z obalu. Krytl vykazuje viskozitu 25% - 65%.
- Krytl krytl, aby pokryl celý povrch rany. U menších ran lze krytl ušitřnout na velikost, která umožňuje úplné zakrytí rany. V případě větších ran sa obväz může skrátit na velikost, která umožňuje úplné pokrytí rany. Při větších ranách možno aplikovat viac obväzov. Na vstřebatelný obväz sa odporúča dodatočne použiť absorpčný obväz a celé miesto zafixovať napríklad elastickým bandážovým seifkou.
- Ak dýje k resorpcii (narušení struktúry obväzu), je potrebné aplikovať ďalší obväz bez odstránenia predchádzajúceho. Postupujte podľa tohto postupu, kým sa rana nezahojí.

INFORMACE O STERILNÍ PROSTŘEDKU

Obväz Medisorb R MEMBRANE je ponúkaný na predaj v sterilnom stave. Výrobok sa nesmie opätovne sterilizovať. Výrobok si zachováva svoju sterilitu len v pôvodnom obale, pri dodržaní vhodných skladovacích podmienok, počas stanovenej doby použitelnosti. V prípade poškodenia bezprostredného obalu sa musí s týmto zdravotníckym produktom zachádzať ako s nesterilným a nesmie sa používať.

PODMIEKY SKLADOVANIA

- Obväz Medisorb R MEMBRANE je potrebné uchovávať: • na mieste s nízkym vplyvom slnečného a UV žiarenia; • v teplotnom rozsahu 15°C - 35°C; • v relatívnej vlhkosti 25% - 65%;
- v podmienkach, ktoré zabránia navlhnutiu a mechanickému poškodeniu alebo chemickému kontaminácii;
- v originálnom jednotlivom obale. Akékoľvek mechanické poškodenie obalu môže spôsobiť stratu sterility produktu.

DOPPLÄJŠIE INFORMÁCIE

Súhrn bezpečnosti a klinickej účinnosti produktu je k dispozícii na webovej stránke tricomed.com

Obväz je dostupný aj vo forme poréznej membrány s pridaným mikroštruktúrou (Medisorb R) a vo forme prášku (Medisorb R POWDER).

Datum vydání: 03.2024
Číslo vydání: REV. 2

ro

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Medisorb R
MEMBRANE
Pansament resorabil

CHARACTERISTICI

Medisorb R MEMBRANE este un pansament resorabil steril sub formă de peluclă poroasă pentru tratamentul rănilor cronice, greu de vindecate. Produsul este conceput pentru a crea un mediu optim de regenerare. Pansamentul este sterilizat în ambalajul său original. Produsul este destinat utilizării ca pansamentul sub substanțe care se găseesc în mod natural în corpul uman și care influențează regenerarea (esuturilor). Structura poroasă a pansamentului permite exsudatului de exsudat să se scurgă din mediul plăgii și datorită resorbției, nu este necesară înlocuirea pansamentului, eliminând durerea asociată și permițând ca țesutul nou format să fie protejat de leziuni. Produsul continue absorbția de origine animală – copolimer de butiril-acetil chitină. Compoziția produsului: 100% copolimer de butiril-acetil chitină.

SCOP SI INDICAȚII

Pansamentul este destinat tratamentului rănilor cronice exsudative, greu de vindecate, infestate sau neinfestate de diferite origini, cum ar fi plăgile venoase, piciorul diabetic, escar de decubit, plăgile traumatice, plăgile chirurgicale și plăgile după arsuri. Produsul este destinat utilizatorilor care pansază răni exsudative, cronice și dificil de vindecate.

CONTRAINDICAȚII

Dispozitivul medical Medisorb R MEMBRANE nu trebuie utilizat: • pe răni uscate, cu cruste uscate sau necroză necrotă; • la persoanele alergice la chitină (obținută din crustacee) și la derivații acesteia.

REAȚII ADVERSE

Nu au existat complicații sau reacții adverse asociate cu acțiunea directă a pansamentului. În caz de reacții adverse, trebuie să se consulte medicul. Incident grav care implică dispoziții medicale trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul în care este domiciliat utilizatorul sau pacientul.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Dispozitivul medical de unică folosință. Reaplicarea pansamentului nu este posibilă din cauza pierderii sterilității produsului. În cazul stării, trebuie să se folosească dispozitivul este reutilizat, se pot transmite agenți patogeni.
- Pansamentul Medisorb R MEMBRANE este oferit spre vânzare în stare sterilă. Produsul nu trebuie să fie reutilizat.
- Nu utilizați pansamentul dacă există indicii cu privire la sterilitatea produsului.
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- În cazul în care există indicii cu privire la utilizarea produsului, nu s-au constatat interacțiuni ale dispozitivului medical și ale produselor sale metabolice cu alte dispozitive, medicamente sau alte substanțe.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare.
- Consultați medicul: • înainte de utilizare la femeile însărcinate sau care alăptează; • în caz de agravare a stării plăgii; • în absența semnelor de resorbție (mai mult de 1 lună).
- Nu utilizați pansamentul după data de expirare.
- Produsul continue o substanță de origine animală – un derivat de chitină. Din cauza prezentei substanțelor de origine animală în pansament, acesta nu trebuie utilizat de persoanele cu hipersensibilitate la produsele din crustacee.
- Pansamentul este destinat exclusiv uzului extern.
- În ambalajul original (picul cu pansament) există un marcat – roșu după sterilizare